



Rådgör med läkare om du tar:

- ▶ **syranneutraliserande medel** för att behandla magsår, halsbränna eller refluxsjukdom, som innehåller aluminium och/eller magnesiumhydroxid.
- ▶ **mineraltillskott** eller **vitaminer**, som innehåller magnesium eller järn.

Biverkningar

Liksom alla läkemedel kan BIKTARVY orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem. De vanligaste biverkningarna är huvudvärk, diarré och illamående.

Om du får biverkningar, tala med läkare eller apotekspersonal. Läs bipacksedeln för mer information om eventuella biverkningar och hur de ska rapporteras.

Sluta aldrig att ta ditt läkemedel utan att du har pratat med din läkare först!

Kontakta: _____

Avdelningens telefonnummer: _____



Guide till patienter som påbörjar behandling med BIKTARVY®

Läs noga igenom bipacksedeln
innan du börjar ta BIKTARVY.

Vad är BIKTARVY® för typ av läkemedel?

BIKTARVY är ett läkemedel för behandling av hiv-1 hos vuxna och barn i åldern 2 år och äldre som väger minst 14 kg. BIKTARVY består av tre substanser i en tablett som motverkar hiv-viruset i kroppen.

BIKTARVY är en liten tablett som tas en gång om dagen, med eller utan mat (inga matrestriktioner).

En tablett innehåller:



Vikten av att ta sitt läkemedel

- ▶ Att ta sitt läkemedel regelbundet är viktigt för att hålla kvar virusnivåerna på en oupptäckbar nivå, samt motverka risken för att man utvecklar resistens mot läkemedlet, vilket kan leda till att det slutar fungera och virusnivåerna stiger igen.
- ▶ Försök att skapa rutiner kring hur du tar din medicin. Till exempel ladda ner en app som påminner dig om att ta din tablett eller lägg in en påminnelse i din mobil.



En tablett en gång om dagen



Kan tas när som helst på dagen



Kan tas med eller utan mat

Om du har glömt att ta BIKTARVY

Det är viktigt att du inte missar någon dos av BIKTARVY. Om du missar en dos:

- ▶ **Om du kommer ihåg det inom 18 timmar** efter den tidpunkt då du brukar ta BIKTARVY, måste du ta tablettens så snart som möjligt. Ta sedan nästa dos som vanligt.
- ▶ **Om du kommer ihåg det efter 18 timmar eller mer** efter den tidpunkt då du brukar ta BIKTARVY ska du inte ta den missade dosen. Vänta och ta nästa dos vid den vanliga tidpunkten.
- ▶ **Om du kräks** inom mindre än 1 timme efter en dos BIKTARVY, ta en ny tablett. Om du kräks mer än 1 timme efter att ha tagit BIKTARVY, behöver du inte ta en ny tablett förrän nästa normalt schemalagda dos.

Läkemedel som aldrig får tas med BIKTARVY:

- ▶ **rifampicin**, används för att behandla vissa bakterieinfektioner såsom tuberkulos.
- ▶ **Johannesört** (*Hypericum perforatum*), ett växtbaserat läkemedel som används mot lätt nedstämdhet och ångest.