

# En guide för patienter som påbörjar behandling med Sunlenca▼

Läs noga informationen i bipacksedeln innan du börjar  
din behandling eller läs mer på [www.fass.se/allmanhet](http://www.fass.se/allmanhet)

▼ Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.



### **Vilken typ av läkemedel är Sunlenca?**

Sunlenca, filmdragerade tabletter och injektionsvätska, lösning, innehåller den aktiva substansen lenacapavir. Det är ett antiretroviralt långtidsverkande läkemedel som kallas kapsidhämmare.

Sunlenca används till behandling av hivinfektion hos vuxna som har svårt att upprätthålla ett bestående virologiskt svar på grund av multiresistent hiv. Sunlenca är inte en fullständig behandlingsregim. Det måste tas tillsammans med andra antiretrovirala läkemedel för att effektivt behandla hivinfektion.

---



### **Vikten av att ta läkemedlet**

Det är mycket viktigt för resultatet av din behandling att du tar alla dina hivläkemedel enligt anvisningarna och utan avbrott. Det är det enda sättet att hålla hivviruset på en låg nivå hela tiden. Det kan vara bra att ställa in larm på mobilen så att du kommer ihåg att ta din dagliga medicin. Tala med läkare, sjuksköterska eller apotekspersonal om du får symtom som kan vara biverkningar av något av de läkemedel du får. Sluta inte att ta något av hivläkemedlen, såvida du inte blir ombedd att göra det.

## Hur du tar Sunlenca



Din behandling med Sunlenca startar med tabletter som ska sväljas, följt av injektioner som ges av sjuksköterskan eller läkaren så som beskrivs nedan.



Kom ihåg att tala med läkaren innan du tar tabletterna. Du får anvisningar om när du ska börja ta tabletterna och när ditt besök för de första injektionerna kommer att bokas in.



### BEHANDLINGS-DAG 1:

Två tabletter som sväljes samtidigt, med eller utan mat.



### BEHANDLINGS-DAG 2:

Två tabletter som sväljes samtidigt, med eller utan mat.



### BEHANDLINGS-DAG 8:

En tablett som sväljes med eller utan mat.



### BEHANDLINGS-DAG 15:


Två injektioner som ges samtidigt av sjuksköterska eller läkare.



### VAR SJÄTTE MÅNAD DÄREFTER:

Två injektioner som ges var sjätte månad, alltid räknat från dagen för de två föregående injektionerna.

Det är viktigt att det alltid finns en bokad tid för nästa injektioner och att du inte missar den.



Figur: Doseringschema för Sunlenca-tabletter följt av subkutana Sunlenca-injektioner.

## Om du kräks efter att du tagit Sunlenca-tabletterna



Du kan ta dina Sunlenca-tabletter när som helst på dagen. De filmdragerade tabletterna ska dock sväljas hela utan att delas, krossas eller tuggas.

Om du kräks inom tre timmar efter att du tagit Sunlenca-tabletterna ska du omedelbart kontakta läkaren och ta två tabletter till. Om du kräks mer än tre timmar efter att du tagit Sunlenca-tabletterna behöver du inte ta fler tabletter förrän det är dags för nästa omgång tabletter eller injektioner enligt schemat.

## Om du uteblir från en schemalagd injektion med Sunlenca



Om det har gått mer än sex månader sedan din senaste injektion och Sunlenca-behandlingen ska fortsätta, måste du börja om med behandlingen från dag 1 som beskrivet ovan.

---

### Läkemedel som **aldrig** får tas med Sunlenca:

Det är viktigt att du talar om för läkaren om du tar andra läkemedel när du börjar behandlingen med Sunlenca eller om du har tagit andra läkemedel mellan injektionsbesöken. Kom ihåg att nämna alla eventuella receptbelagda och receptfria läkemedel, vitaminer och kosttillskott som du tar.

Vissa läkemedel kan minska effekten av Sunlenca och får därför inte tas under behandlingen med Sunlenca. Det gäller bland annat **rifampicin** (ett läkemedel som används för att behandla tuberkulos), **karbamazepin** och **fenytoin** (läkemedel som används för att behandla epilepsi) och **johannesört** (*Hypericum perforatum*, ett naturläkemedel som används för att behandla depression och ångest).

## **Biverkningar**

Liksom alla läkemedel kan detta läkemedel orsaka biverkningar, men alla användare behöver inte få dem.

Det är mycket vanligt att patienter får reaktioner på injektionsstället. Det kan vara smärta och obehag, en hård knuta eller knöl och inflammationsreaktioner som rodnad, klåda och svullnad. Dessa reaktioner kan förekomma hos 1 av 10 personer.

Illamående är en vanlig biverkning som kan förekomma hos upp till 1 av 10 personer.

Tala om för läkaren eller sjuksjuksköterskan om du får biverkningar under behandlingen med Sunlenca – även om du får biverkningar som inte nämns i denna information.

Läs bipacksedeln för en mer omfattande förteckning över möjliga biverkningar.

## Övriga upplysningar

Läs noga informationen i **bipacksedeln** som medföljer läkemedlet innan du påbörjar behandlingen med Sunlenca.

Denna patientbroschyr har utarbetats för utbildningsändamål, men den ska inte betraktas som en ersättning för bipacksedeln. Bipacksedeln innehåller en mer omfattande förteckning över biverkningar och andra viktiga upplysningar.



**Vänd dig till sjuksköterskan, läkaren eller apotekspersonalen om du har ytterligare frågor om detta läkemedel.**



Denna broschyr är avsedd för patienter som har ordinerats Sunlenca.  
För fullständig information se bipacksedeln, eller läs mer på [www.fass.se/allmanhet](http://www.fass.se/allmanhet)

